

クロゴキブリ

分類 ゴキブリ目ゴキブリ科

学名 *Periplaneta fuliginosa*

英名 Smoky-brown cockroach



■解説^{1) 2) 4)}

本種は、日本においては九州から北海道まで広く分布しており、木造の日本家屋、コンクリート造りのアパートなどの一般家庭でもよく見られる。主な活動期は5月～9月であり雌はこの間に産卵を行う。また、夜間活動性で夜間に住处から餌や水を求めて活動する。熱や水分を好み、調理場などの餌もあり、水や熱源がある箇所に潜伏することが多い。

■体長

卵 : 平均 12.2 mm (卵鞘)²⁾
幼虫 : -
蛹 : -
成虫 : ♂. 25mm 内外、♀. 25～30mm²⁾

■産卵数

産卵数/1 卵鞘 : 22～28 卵
(28℃、70～80%RH)¹⁾
産卵鞘数/1♀ : 約 20 回 (25℃)²⁾

■ライフサイクル

卵 : 31～47 日 (28℃、70～80%RH)¹⁾
約 42 日 (25℃)²⁾
32～36 日 (30～32℃)²⁾
幼虫 : 84～112 日 (28℃、70～80%RH)¹⁾
蛹 : -
成虫 : ♂約 207 日、♀約 197 日²⁾

■発育零点 (発育停止温度)

16.0～16.5℃ (幼虫期)³⁾

【参考文献】

- 1) 安富和男、梅谷献二：衛生害虫と衣食住の害虫、p31・39、全国農業教育協会(1983)
- 2) 緒方一喜、田中生男、安富和男：ゴキブリと駆除、p22-26、(財)日本衛生環境センター (1989)
- 3) 松崎沙和子・武衛和雄：都市害虫百科、p236、朝倉書店(1993)
- 4) 梅谷 献二、岡田 利承：日本農業害虫大事典、p979、全国農村教育協会