

## クロゴキブリ

分類：ゴキブリ目(網翅目)ゴキブリ科

学名：*Periplaneta fuliginosa*

英名：Smoky-brown cockroach



### ■解説<sup>1) 2) 4)</sup>

本種は、日本においては九州から北海道まで広く分布しており、木造の日本家屋、コンクリート造りのアパートなどの一般家庭でもよく見られる。主な活動期は5月～9月であり雌はこの間に産卵を行う。また、夜間活動性で夜間に住処から餌や水を求めて活動する。熱や水分を好み、調理場などの餌もあり、水や熱源がある箇所に潜伏することが多い。

### ■体長

卵：平均 12.2 mm (卵鞘)<sup>2)</sup>  
幼虫：—  
蛹：—  
成虫：♂25mm 内外、♀25～30mm<sup>2)</sup>

### ■産卵数

産卵数/1卵鞘：22～28卵  
(28℃、70～80%RH)<sup>1)</sup>  
産卵鞘数/1♀：約20回(25℃)<sup>2)</sup>

### ■ライフサイクル

卵：31～47日(28℃、70～80%RH)<sup>1)</sup>  
約42日(25℃)<sup>2)</sup>  
32～36日(30～32℃)<sup>2)</sup>  
幼虫：84～112日(28℃、70～80%RH)<sup>1)</sup>  
蛹：—  
成虫：♂約207日、♀約197日<sup>2)</sup>

### ■発育零点(発育停止温度)

16.0～16.5℃(幼虫期)<sup>3)</sup>

### 【参考文献】

- 1) 安富和男・梅谷献二. 衛生害虫と衣食住の害虫. 全国農村教育教会. 1995, p. 31, 39
- 2) 緒方一喜・田中生男・安富和男. ゴキブリと駆除. 日本環境衛生センター. 1989, p. 22-26
- 3) 松崎沙和子・武衛和雄. 都市害虫百科. 朝倉書店. 1993, p. 22
- 4) 梅谷献二・岡田利承. 日本農業害虫大事典. 全国農村教育教会. 2003, p. 979