

ヒメマルカツオブシムシ

分類 鞘翅目カツオブシムシ科

学名 *Anthrenus verbasci*

英名 Varied carpet beetle



■解説^{1) 2)}

本種は、成虫は花蜜などに多く集まる。花に誘引される要因に匂はあまり関係なく、色によって誘引されるため、干してある洗濯物にまぎれ込んで屋内にとり込まれることが往々ある。幼虫が屋内で加害するものは、ケラチンを消化することができるため、昆虫標本、羊毛のカーペットや衣類、毛布、毛髪・羽毛・骨製品、皮革、乾魚、絹織物、蚕蛹、蚕繭など多岐に亘り、蛾類の卵塊を食することもある。なお、本種は、コショウ、トウガラシ、各種生薬、穀類、種子などの植物質のみで生育を完了することが出来る点が本科の他の種と異なる所である。

■体長

卵 : 0.6 mm²⁾

幼虫 : 4mm 内外 (老熟)¹⁾

蛹 : 3~3.5mm¹⁾

成虫 : 1.7~3.2mm¹⁾

■産卵数

産卵数/生涯 : 20~100 卵 (平均 30~60 卵)¹⁾

■ライフサイクル

卵 : 30~35 日 (18.3℃)、14~17 日 (23.8℃)、10~12 (29.4℃)¹⁾

幼虫 : 300 日内外¹⁾

蛹 : 17~19 日 (18.3℃)、10~12 日 (23.8℃)、7~8 日 (29.4℃)¹⁾

成虫 : ♂30 日 ♀30~40 日 (3~4 月)¹⁾

【参考文献】

1) 日本家屋害虫学会編：家屋害虫辞典、p468、井上書院(1995)

2) 佐藤仁彦：生活害虫の辞典、p352、朝倉書店(2003)