

医薬品を正しく購入するための説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書をお読みください。

1	名 称	パナプレート																					
2	成分・分量	有効成分：製品 1枚 (120g)中 ジクロロボス 19.2g 添加物：塩化ビニル樹脂 その他4成分																					
3	用法・用量	<p>1. 本剤は開封したのち、下記要領に従い使用すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用場所</th> <th>対象害虫</th> <th>使用量</th> <th>使用法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域： 店舗、ホテル、旅館、工場、 倉庫、畜舎、テント、地下室</td> <td rowspan="2">ハエ、蚊</td> <td>25～30㎡の容積 当たり1枚 (目安、6～8畳、 高さ2.5mに相当)</td> <td>天井または壁に吊す (高さ2m位に)</td> </tr> <tr> <td>便 所</td> <td>8～12㎡の容積 当たり1枚</td> <td>天井または壁に吊す マンホール内又は 蓋の内側に吊す</td> </tr> <tr> <td>下水槽 浄化槽</td> <td rowspan="2">ハエ、 ゴキブリ</td> <td rowspan="2">5～10㎡の容積 当たり1枚</td> <td>蓋の内側に貼付する</td> </tr> <tr> <td>ゴミ箱 厨 芥 箱</td> <td>天井または壁に吊す 容器内に吊す</td> </tr> <tr> <td>戸 棚 キャビネット</td> <td>ハエ、蚊、 ゴキブリ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも 3m以上の間隔で吊すこと。 3. 開封した本剤の有効期間は、3ヶ月である。 4. 使用中、殺虫効果が低下したと思われるら、本剤の表面に付着したゴミまたは水分等を紙や布片でふきとると再び効果が見られます。</p>	使用場所	対象害虫	使用量	使用法	以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域： 店舗、ホテル、旅館、工場、 倉庫、畜舎、テント、地下室	ハエ、蚊	25～30㎡の容積 当たり1枚 (目安、6～8畳、 高さ2.5mに相当)	天井または壁に吊す (高さ2m位に)	便 所	8～12㎡の容積 当たり1枚	天井または壁に吊す マンホール内又は 蓋の内側に吊す	下水槽 浄化槽	ハエ、 ゴキブリ	5～10㎡の容積 当たり1枚	蓋の内側に貼付する	ゴミ箱 厨 芥 箱	天井または壁に吊す 容器内に吊す	戸 棚 キャビネット	ハエ、蚊、 ゴキブリ		
使用場所	対象害虫	使用量	使用法																				
以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域： 店舗、ホテル、旅館、工場、 倉庫、畜舎、テント、地下室	ハエ、蚊	25～30㎡の容積 当たり1枚 (目安、6～8畳、 高さ2.5mに相当)	天井または壁に吊す (高さ2m位に)																				
便 所		8～12㎡の容積 当たり1枚	天井または壁に吊す マンホール内又は 蓋の内側に吊す																				
下水槽 浄化槽	ハエ、 ゴキブリ	5～10㎡の容積 当たり1枚	蓋の内側に貼付する																				
ゴミ箱 厨 芥 箱			天井または壁に吊す 容器内に吊す																				
戸 棚 キャビネット	ハエ、蚊、 ゴキブリ																						
4	効能・効果	ハエ、蚊、ゴキブリ等の殺虫駆除																					
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>[注意－人体に使用しないこと]</p> <p>[してはいけないこと] (守らないと副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。 飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所((調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないこと。 <p>[相談すること]</p> <ol style="list-style-type: none"> 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。 万一、身体に異常(倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等)が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤(2-ピリジンアルドキシムメチオダイド製剤)が有効であると報告されている。 表面に少量の液体が付着することがあるので、眼に入らないよう注意すること。万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けること。 <p>[その他の注意]</p> <ol style="list-style-type: none"> 定められた用法及び用量を厳守すること。 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用すること。 愛玩動物(小鳥、魚等)のすぐそばに吊るすことは避けること。 有害であるから飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにすること。 本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんと水でよく洗うこと。 本剤を多量に又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を着用すること。 使用直前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておくこと。 一度開封したら、必ず使用するようにすること。 <p>[保管及び取り扱い上の注意]</p> <p>直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管してください。</p>																					
6	薬剤師が必要と判断する事項																						

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不必要とした場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談ください。