

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください —

添付文書改訂のお知らせ

一般用医薬品

第1類医薬品

樹脂蒸散殺虫剤

パナアレート **パナアレートハーフ**

謹啓

時下、ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、上記当社製品の添付文書を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

本改訂は添付文書の記載要領の改訂に伴うもので、「用法及び用量」、「効能又は効果」は従来どおりであり、変更はございません。

また、使用上の注意も記載要領に従い表記方法等を改めましたが、その内容自体に変更はございません。

ご使用に際しましては、改訂後の添付文書の各項を十分にご覧いただきますようお願い申し上げます。

また、改訂した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要しますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

謹白

お問い合わせ先

国際衛生株式会社

お客様相談窓口

電話：03-3667-6711

[改訂の概要]

項	改訂内容
使用上の注意 「してはいけないこと」 「相談すること」	赤字表記にし、赤枠を付した。 記載事項を整備し、一部を表形式とした。 記載の一部を「用法及び用量に関連する注意」に移行した。
用法及び用量に関連する注意	「その他の注意」から移行し、記載内容を整備した。
保管及び取扱い上の注意	「保管及び取扱い上の注意」と「廃棄の方法」の項目を統合した。

詳細は次ページ以降をご覧ください。

部： 変更箇所

部： 削除

改訂後	改訂前								
樹脂蒸散殺虫剤	気化性防殺虫剤								
<p><使用上の注意></p> <p>■してはいけないこと</p> <p><u>以下の場所では使用しないこと。</u></p> <ol style="list-style-type: none">居室（客室、事務室、教室、病室を含む）、居室にある戸棚・キャビネット内飲食する場所（食堂等）、飲食物が露出している場所（調理場、食品倉庫、食品加工場等）	<p><使用上の注意事項></p> <p>■してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none">居室（客室、事務室、教室、病室を含む）では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないでください。飲食する場所（食堂など）及び飲食物が露出している場所（調理場、食品倉庫、食品加工場など）では使用しないでください。								
<p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"><u>次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。</u> 薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人<u>使用開始後、次の症状が現れた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って、医師又は薬剤師に相談し、本品が有機リン系の殺虫剤であることを告げること。</u> <table border="1" data-bbox="293 1536 751 1711"><thead><tr><th>関係部位</th><th>症 状</th></tr></thead><tbody><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛、めまい</td></tr><tr><td>消化器</td><td>腹痛、下痢、吐き気、嘔吐</td></tr><tr><td>その他</td><td>全身のだるさ、多汗</td></tr></tbody></table> <p>本品の解毒剤としては、プラリドキシム（PAM）製剤及びアトロピン製剤が有効であると報告されている。</p>	関係部位	症 状	精神神経系	頭痛、めまい	消化器	腹痛、下痢、吐き気、嘔吐	その他	全身のだるさ、多汗	<p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">万一、身体に異常（倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等）が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けて下さい。 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤（2-ピラジンアルドキシムメチオダイド製剤）が有効であると報告されています。今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
関係部位	症 状								
精神神経系	頭痛、めまい								
消化器	腹痛、下痢、吐き気、嘔吐								
その他	全身のだるさ、多汗								

<p>用法及び用量に関連する注意へ移行</p>	<p>3. 表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けてください。</p>
<p><用法及び用量に関連する注意></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定められた用法及び用量を厳守すること。 2. <u>表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。</u> 3. 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用すること。 4. 愛玩動物（小鳥，魚等）のそばに吊るすことは避けること。 5. 飲食物，食器，小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにすること。 6. 本品を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は，手や触れた部分の皮膚を石けんと水でよく洗うこと。 7. 本品を多量に，又は頻繁に取り扱う場合は，ゴム手袋を着用すること。 8. 使用直前に開封し，有効期間そのまま吊り下げておくこと。 9. 一度開封したら必ず使用すること。 	<p>■その他の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定められた用法及び用量を厳守してください。 2. 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用してください。 3. 愛玩動物（小鳥，魚等）の直ぐそばに吊るすことは避けてください。 4. <u>有害であるから</u>飲食物，食器，小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにしてください。 5. 本剤を多量に又は頻繁に取り扱う場合は，ゴム手袋を着用してください。 6. 本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は，石けんと水でよく洗ってください。 7. 使用直前に開封し，有効期間そのまま吊り下げておいてください。 8. 一度開封したら必ず使用するようになっています。
<p><成分及び分量></p> <p>パナプレート</p> <p>有効成分：1枚（120g）中ジクロリス 19.2g</p> <p>添加物：塩化ビニル樹脂その他4成分</p> <p>パナプレートーフ</p> <p>有効成分：1枚（60g）中ジクロリス 9.6g</p>	<p><成分及び分量></p> <p>パナプレート</p> <p>有効成分：ジクロリス 1枚中 19.2g</p> <p>塩化ビニル樹脂他，その他成分 1枚中 100.8g</p> <p>内容量 1枚 120g</p> <p>パナプレートーフ</p> <p>有効成分：ジクロリス 1枚中 9.6g</p>

<p>添加物：塩化ビニル樹脂その他4成分</p>	<p>塩化ビニル樹脂他, その他成分 1 枚中 50.4 g 内容量 1 枚 60 g</p>
<p><保管及び取り扱い上の注意></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>直射日光が当たらない、涼しい所に保管すること。</u> 2. <u>食品、食器、餌等と区別し、小児や愛玩動物の手等がとどかない所に保管すること。</u> 3. 不用になった包装は、プラスチックごみとして、市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。 4. <u>開封後、有効期間が過ぎ、効力がなくなった製品は、プラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。</u> 	<p><保管及び取り扱い上の注意></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管してください。 <p><廃棄の方法></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用になった包装は、プラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。 2. 開封した本剤の有効期間は2～3箇月です。有効期間が過ぎ、効力がなくなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。
<p><u>樹脂に練り込まれた有効成分が少しずつ自然蒸散し効き目を発揮する。開封して吊しておくだけで3箇月間有効である。</u></p>	
<p>使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時には、弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。</p>	<p>記載内容をよく読んでお使いください。必要な時に読めるように保管してください</p>